reflet soyeux. Les poils d'un jaune orangé, qui, chez *O. cumedidoides*, se trouvent à l'intersection des nervures et des deux lignes des ailes supérieures, se retrouvent chez *O. Aurora*. Mais, dans cette espèce, ils ne sont pas limités strictement au point de l'intersection, et ont une tendance à s'étendre le long des nervures.

Les ailes inférieures, velues sur leur première moitié, ont un ton plus franchement rose que les supérieures.

Le dessous des quatre ailes est concolore, rose saumoné, avec les nervures marquées en jaune clair, surtout à la côte.

Antennes pectinées, noires. Thorax couvert de poils d'un jaune clair. L'abdomen est, en dessus, couvert de poils d'un jaune orangé, avec une touffe de poils de même couleur à l'extrémité anale ; en dessous, il est d'un jaune plus clair, et, sur le côté, chaque anneau présente une tache d'un jaune rosé, peu nette et entourée de noir.

♂ provenant de Bogota. Coll. Staudinger.

6. **Neurophana amatonga**, n. sp. — Enverg. 43 mill. — Le dessin de cette espèce est très simple : en dessus, les quatre ailes sont d'un jaune ochracé et les nervures sont marquées en gris noirâtre ; aux ailes antérieures, la côte et le bord externe sont longés par une bande d'un gris noirâtre, qui, très large vers l'apex, va s'amincissant vers l'angle interne. La même bande se continue sur le bord externe des inférieures et s'arrête à l'angle abdominal ; tout le bord externe est bordé de poils noirs très fins.

Le dessous des quatre ailes est semblable au dessus, sauf en ce que les nervures sont moins fortement marquées qu'en dessus.

Antennes filiformes, noires, ainsi que la tête. Collier et ptérygodes d'un jaune ochracé, et le thorax est couvert de poils de même couleur ; l'abdomen est jaune ochracé, avec des raies noires, transverses, terminées chacune par un point de même couleur de chaque côté.

♀ provenant de la côte orientale d'Afrique, à 150 kilom. sud de la baie de Delagoa. Coll. P. Vuillot.

— M. E. Simon envoie les descriptions de deux Arachnides nouveaux du Portugal :

Amaurobius occidentalis, n. sp. — ♀. Long. 9—12 mill. — *Ab* A. jugorum *L. Koch, cui valde affinis est cephalothorace et oculis fere similis, differt plaga genitali anguste transversa et plus quadruplo latiore quam longiore, leviter procurva et semilunari, ad marginem posticum, in medio, levissime angulosa (in* A. jugorum *plaga circiter duplo*

latiore quam longiore, rufula, postice leviter attenuata et obtusissime triquetra).

Cephalothorax fusco-rufescens vel olivaceus, parte thoracica dilutiore, pilis longis cinereis parce vestitus. Abdomen fusco-cinereo-testaceum, pubescens, in parte secunda arcubus transversis obscurioribus parum expressis ornatum. Pedes obscure fulvo-rufuli vel olivacei, ut in A. jugorum *aculeati.*

Portugal : sierra de Estrella (C. de la Brûlerie), La Guarda (P. de Oliveira).

Cette espèce a été découverte par C. de la Brûlerie dans la sierra d'Estrella et retrouvée depuis en Portugal par M. le prof. P. de Oliveira. Je l'avais jusqu'ici confondue avec *A. jugorum* L. Koch (cf. Arachnides de France, T. I, p. 234), dont elle est en effet très voisine; elle s'en distingue cependant par la forme de sa plaque génitale, qui rappelle un peu celle de *A. pallidus* L. Koch.

Titanœca Sequerai, n. sp. — ♂. Long. 8 mill.; ♀. long. 9 mill. — *A* T. albomaculata *Lucas, cui affinis est, differt imprimis clypeo oculis anticis plus duplo latiore (in* T. albomaculata *vix latiore), tibiis metatarsisque maris similiter aculeatis sed tarsis aculeis minutissimis biseriatis ut in* T. præfica *et* flavicoma *subtus instructis, tibiæ pedum-maxillarium apophysi interiore ad basin subglobosa (in* T. albomaculata *antice turbinata) ad apicem acuta et antice recte inflexa, apophysi media lamellosa utrinque crasse marginata ad apicem leviter attenuata et obtusa (in* T. albomaculata *ad apicem ample rotunda).*

♂, ♀. *Cephalothorax, sternum chelæque nigra. Abdomen nigro-opacum, sericeo-pubescens, sæ albo-maculatum : ad marginem anticum maculis magnis binis inter se appropinquatis et obliquis, prope medium maculis binis sat magnis, rotundis, dein maculis parvis binis sæpe obsoletis. Pedes femoribus nigris, reliquis articulis fusco-rufescentibus. Sternum levissime inæquale. Chelæ maris subplanæ, extus usque ad apicem valde carinatæ, dense et subtiliter granulosæ, granulis majoribus conspersæ et transversim parce striatæ, chelæ feminæ convexiore, haud carinatæ et subtilius coriacea.*

♀. *Plaga vulvæ plana, nigra, utrinque subtiliter striata, in medio carina lata lævi divisa.*

Portugal : Regoa (Ed. Sequera).

— M. A. Léveillé signale la capture, faite par lui au mois de juin der-